

Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables

Asfixias





Asfixias


Distribución porcentual y tasa de mortalidad por asfixias según características seleccionadas, 2016

Características seleccionadas	Muertes	Porcentaje	Tasa ¹
Sexo			
Hombres	103	78.0	2.6
Mujeres	29	22.0	0.7
No especificados	-	-	-
Grupos de edad			
0 a 9 años	36	27.3	2.4
10 a 19 años	5	3.8	0.3
20 a 59 años	60	45.5	1.4
60 y más	24	18.2	2.9
No especificados	7	5.3	0.0
Lugar de ocurrencia			
Vivienda particular	39	29.5	0.5
Vivienda colectiva	1	0.8	0.0
Escuela u oficina pública	-	-	-
Áreas deportivas	-	-	-
Calle o carretera (vía pública)	12	9.1	0.1
Áreas comercial o de servicios	3	2.3	0.0
Área industrial (taller, fábrica u obra)	3	2.3	0.0
Granja (rancho o parcela)	4	3.0	0.0
Otro	28	21.2	0.3
Se ignora	42	31.8	0.5
Tipo de asfixias			
Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	-	-	-
Ahorcamientos accidentales	6	4.5	0.1
Obstrucción de la respiración	3	2.3	0.0
Inhalación de contenidos gástricos	56	42.4	0.7
Inhalación e ingestión de alimento	12	9.1	0.1
Inhalación e ingestión de otros objetos	2	1.5	0.0
Atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	3	2.3	0.0
Otras obstrucciones especificadas de la respiración	3	2.3	0.0
No especificados	47	35.6	0.6
Total	132	100.0	1.6
Lugar que ocupan las asfixias en grupos vulnerables dentro de las principales causas de muerte, 2016	0 a 9 años	10 a 19 años	60 y más
	12	34	109

¹Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Fuente: Base de mortalidad 2016 INEGI-SS; SEDD 2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.


Prevalencia lápsica de muertes por asfixias, 2012-2016 por municipio



Prevalencia lápsica 2012-2016 por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2012-2016 INEGI-SS; SEDD 2012-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la

Gráfica 1. Tasa de mortalidad por asfixias, por sexo, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.

Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.




Asfixias

Gráfica 2. Tasa de mortalidad por asfixias, en grupos vulnerables, 2000-2016




Tasa de mortalidad por cada 100 mil personas.
 Fuente: Bases de mortalidad 2000-2016 INEGI-SS; SEDD 2000-2016, DGIS-SS y Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 del CONAPO.

Gráfica 3. Registros hospitalarios por asfixias, según sexo y fuente de información, 2014, 2015 y 2016




Fuente: Egresos hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2014, 2015 y 2016; información del Subsistema Automatizado Egresos Hospitalarios, 2014, 2015 y 2016; y de la hoja de registro de atención por lesiones y causas de violencia (SIS-SS-17P), 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 4. Asfixias no fatales en grupos vulnerables, 2000, 2006 y 2012



Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud, 2000, 2006 y 2012.

Gráfica 5. Porcentaje de asfixias con presencia de alcohol según tipo de servicio médico, 1994-2016



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones: Módulos de Servicio Médico Forense y de los Servicios de Urgencias Hospitalarias 1994-2016.



RIESGOS DE ASFIXIAS EN EL HOGAR

En la última década **fallecieron** 29 mil 397 personas por **asfixias**, de estos 12 mil 211 sucedieron en el hogar¹. Cada año, 47 mil 256 personas sufren **lesiones no fatales** y 8 mil 978 de ellas sufren **discapacidad**².

69% de los hogares encuestados en donde viven menores de 1 año, tienen cunas que no cuentan con barrotes verticales ni con una separación adecuada (7cm) entre ellos⁴.



En **42%** de los hogares donde viven menores de 10 años, estos usan de manera frecuente chamarras y sudaderas con cordones o agujetas⁴.



En **71%** de los hogares donde viven menores de 1 año, estos duermen en la misma cama con la madre, padre o ambos⁴.




9% de los hogares donde viven menores de 5 años, reportó que estos usan collares, cadenas o les amarran el chupón en el cuello⁴.

22% de los hogares donde habitan menores de 5 años, tienen juguetes cuyo tamaño podrían causar un atragantamiento⁴.



En **33%** de los hogares cuentan con cordones de cortinas o persianas a una altura menor de 1.20 metros, aumentando la probabilidad de sufrir ahorcamiento⁴.



En **41%** de los hogares encuestados en los que habitan menores de 5 años, hay juguetes con cordones mayores a 15 centímetros⁴.



En **25%** de los hogares encuestados, tardan más de 60 minutos en trasladarse a un hospital³.

Fuentes:

¹Bases de mortalidad 2006-2016, INEGI-SS; DGIS-SS.

²Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud 2006-2016.

³Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, INEGI.

⁴Encuesta de Identificación en Hogares 2016 y 2017, ST CONAPRA.



RIESGOS DE ASFIXIAS EN EL HOGAR

En la última década **fallecieron** 29 mil 397 personas por **asfixias**, de estos 12 mil 211 sucedieron en el hogar¹. Cada año, 47 mil 256 personas sufren **lesiones no fatales** y 8 mil 978 de ellas sufren **discapacidad**².

69% de los hogares encuestados en donde viven menores de 1 año, tienen cunas que no cuentan con barrotes verticales ni con una separación adecuada (7cm) entre ellos⁴.



En **42%** de los hogares donde viven menores de 10 años, estos usan de manera frecuente chamarras y sudaderas con cordones o agujetas⁴.



En **71%** de los hogares donde viven menores de 1 año, estos duermen en la misma cama con la madre, padre o ambos⁴.




9% de los hogares donde viven menores de 5 años, reportó que estos usan collares, cadenas o les amarran el chupón en el cuello⁴.

22% de los hogares donde habitan menores de 5 años, tienen juguetes cuyo tamaño podrían causar un atragantamiento⁴.



En **33%** de los hogares cuentan con cordones de cortinas o persianas a una altura menor de 1.20 metros, aumentando la probabilidad de sufrir ahorcamiento⁴.



En **41%** de los hogares encuestados en los que habitan menores de 5 años, hay juguetes con cordones mayores a 15 centímetros⁴.



En **25%** de los hogares encuestados, tardan más de 60 minutos en trasladarse a un hospital³.

Fuentes:

¹Bases de mortalidad 2006-2016, INEGI-SS; DGIS-SS.

²Instituto Nacional de Salud Pública; Encuestas Nacionales de Salud 2006-2016.

³Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, INEGI.

⁴Encuesta de Identificación en Hogares 2016 y 2017, ST CONAPRA.