



SALUD



CONSEJO ESTATAL PARA LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

CEPAJ

Uso de factores protectores en Motociclistas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.





SALUD



Mundo



Cada año fallecen 1.25 millones de personas en vialidades del mundo. (OMS, 2015)

23 % de estas defunciones corresponden a motociclistas y 22% a peatones.



México



En México durante el año 2015 se registraron 115,441 personas con lesiones por accidentes de tránsito.



“En México, conducir una motocicleta representa un riesgo 6 veces mayor de sufrir lesiones graves y 3 veces mayor de morir en comparación con conducir un automóvil.”

Fuente: STCONAPRA, con datos de Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, INEGI 2012.


“El uso correcto de casco disminuye un 72% el riesgo y la gravedad de los traumatismos craneales.”

Fuente: Cascos: un manual de seguridad vial para decisores y profesionales (OMS-FIA –Foundation).



Objetivo: Identificar la prevalencia del uso factores protectores en conductores de motocicleta en la zona de Guadalajara 2016.

Uso de factores protectores en conductores de motocicleta y acompañantes.



Uso de casco en motociclistas

- **El 79% de motociclistas Usan casco**, el 88.1% de los cascos cuentan con algún tipo certificación,
- Tipo de casco más usado es el de tipo
- **a) Integral 51%**, b) Abierto 31% c) Semicasco 8.8% d) Tropical 7.8%



LESIONES v/s PROTECCION





SALUD



CONSEJO ESTATAL PARA LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

CEPAJ

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

**Lago Tequesquitengo # 2600
Col. Lagos del Country, Zapopan, Jalisco.**